



10. évfolyam Iskolai oltási program – tájékoztató szülőknek

Mi az a meningococcus megbetegedés?

A meningococcus nem gyakori, de néha életveszélyes betegség. A betegség a vér és/vagy a gerincvelőt és az agyat borító membránok bakteriális fertőzésének eredménye.

Bár antibiotikumokkal kezelhető, a fertőzés nagyon gyorsan elterjedhet, ezért fontos, hogy aki meningococcus megbetegedés tüneteit tapasztalja, azonnal forduljon orvoshoz.

Az egészséges emberek körülbelül 10 százaléka tünetmentesen hordozza az orrában vagy a torkában a meningococcus baktériumokat, és nem betegszik meg.

Hogyan terjed a meningococcus megbetegedés?

A meningococcus baktériumok légúti váladékkal terjednek (köhögés, tüsszögés vagy csókolózás során). A baktériumok nem élnek néhány másodpercnél tovább a környezetben.

A betegség nagy valószínűséggel csak nagyon közeli kontaktus esetén terjed, például egy háztartásban élők, szexuális kapcsolatban állók, vagy négy óránál hosszabb ideig ugyanabban a napközbeni gondozásban részesülő gyermekek között.

Miért kínál a WA Health oltási programot a 10. évfolyamos diákok számára?

A meningococcus megbetegedés bármely korosztályt érinthet. A meningococcus hordozásának és megbetegedésének mindazonáltal a serdülők körében a legmagasabb az aránya, és ez a korcsoport olyan személyeknek, köztük kisgyermekeknek is átadhatja a baktériumokat, akiknél fokozott a fertőzés kockázata.

A 10. évfolyamos diákok immunizálása várhatóan csökkenti a baktériumok másoknak való átadását, és segít megelőzni a fertőzéseket a nagyobb közösségen belül.

Melyik vakcinát fogják használni, és az mennyire hatékony?

A használt védőoltás a meningococcus ACWY elleni vakcina. Ez a vakcina a meningococcus baktériumok négy szerocsoportja ellen nyújt védelmet: A, C, W és Y. Ebben az iskolai programban a Nimenrix® vakcinamárkát fogják használni.

Ezek a védőoltások biztonságosak és hatékonyak. Az Egyesült Királyságban 2015. óta valósítanak meg Meningococcus ACWY oltási programokat 13–15 éves serdülők körében, az Egyesült Államokban pedig 2005. óta 11–12 éves serdülők körében, jelentős aggályok nélkül. A védőoltást rutinszerűen egyetlen adagban adják be. További adag beadása javallott azoknak, akiknél fokozott a kockázata ennek a betegségnek, és azoknak, akik olyan helyre utaznak, ahol ez a betegség gyakori. Tanulmányok kimutatták, hogy a meningococcus ACWY vakcinák hatékonysága serdülőknél 80-85 százalék.

Kinek nem adható be ez a védőoltás?

Tájékoztassa a védőoltást beadó személyt, ha:

- **bármilyen súlyos, életveszélyes allergiája van.**
Ha életveszélyes allergiás reakciója volt egy korábbi meningococcus ACWY vakcina beadása után, vagy ha súlyosan allergiás ennek az oltóanyagnak bármely összetevőjére, nem kaphatja meg ezt a vakcinát. A szolgáltatója tájékoztathatja Önt a vakcina összetevőiről.
- **Ön várandós vagy szoptat.**
A meningococcus elleni védőoltás rutinszerűen nem javasolt terhes vagy szoptató nők számára, de klinikailag indokolt esetben beadható. Kérjük, egyeztessen a háziorvosával, ha Ön várandós lehet vagy szoptat.

Melyek a védőoltás mellékhatásai?

Bármely gyógyszer, köztük a védőoltások esetében is lehetnek gyakori mellékhatások. Ezek általában enyhék, és maguktól elmúlnak. Súlyos reakció előfordulhat, de ritka. Nagyon kicsi az esélye annak, hogy a vakcina súlyos sérülést vagy halált okozzon. Az oltással nem kaphatja el a meningococcus fertőzést.

A gyakori mellékhatások közé tartozik a fájdalom, bőrpír és duzzanat az injekció beadásának helyén, láz, ingerlékenység, álmoság, csökkent étvágy, fejfájás, bőrkiütés és hányinger. A súlyos általános nemkívánatos események azonban ritkák.

A védőoltásokat folyamatosan ellenőrzik, hogy azok biztonságosak és hatékonyak-e. Az oltás biztonságosságáról, valamint a gyakori és ritka mellékhatásokról bővebben a következő oldalon olvashat: healthywa.wa.gov/immunisation



Jelen dokumentum kérelemre,
a fogyatékkal élő személyek részére
más formátumban is rendelkezésre áll.

Készítette: Communicable Disease Control Directorate (Fertőző betegség elleni küzdelemért felelős bizottság)
© Department of Health 2023

A jelen dokumentumhoz fűződő szerzői jogok elérő megjelölés hiányában Nyugat-Ausztrália államát illetik meg. A Copyright Act 1968 (1968. évi szerzői jogi törvény) rendelkezései értelmében megengedett magántanulmányozást, kutatást, kritikai tevékenységet vagy felülvizsgálatot szolgáló tisztességes kereskedelmi tevékenységet leszámítva Nyugat-Ausztrália állam írásbeli engedélye nélkül egyetlen rész sem reprodukálható vagy használható fel semmilyen célra.

Mi van, ha súlyos reakció lép fel – mire kell figyelnem?

Figyeljen mindenre, ami aggasztja Önt, például súlyos allergiás reakció jeleire, nagyon magas lázra vagy szokatlan viselkedésre. A súlyos allergiás reakció jelei lehetnek a csalánkiütés, az arc és a torok duzzanata, légzési nehézség, szapora szívverés, szédülés és gyengeség; ezek általában az oltás után néhány percen vagy néhány órán belül jelentkeznek. Súlyos reakció esetén hívjon mentőt, vagy menjen a legközelebbi sürgősségi osztályra.

Mit kell tennem?

A paracetamol segíthet csökkenteni az enyhe lázat vagy fájdalmat, és egy hűvös, nedves kendő is enyhítheti a fájdalmat az injekció beadásának helyén. Kérjük, forduljon orvoshoz vagy a helyi sürgősségi osztályhoz, ha súlyosnak vagy váratlanul vélt reakciót észlel.

A **healthdirect Auszaliát** is felhívhatja az 1800 022 222-es számon.

A jogszabályok értelmében minden nyugat-auztráliai oltási szolgáltatónak jelentenie kell az immunizálást követő mellékhatásokat. A szülők is jelenthetik az oltás utáni súlyos reakciókkal kapcsolatos aggodalmukat. Tudjon meg többet a healthywa.wa.gov.au/WAVSS oldalon vagy hívja a 6456 0208-as számot.

További információ

Ha kérdése van a meningococcus elleni védőoltásokkal kapcsolatban, forduljon a **healthdirect Auszaliához** az 1800 022 222-es telefonszámon vagy a helyi szolgáltatójához a hozzájárulási űrlapot tartalmazó boríték hátoldalán megadott elérhetőségeken.